

圖45. 薊馬危害幼果




圖46. 薊馬危害成熟果時

(十二)咖啡木蠹蛾(*Zeuzera coffeae*)

據文獻記載，其危害作物約80餘種，幾乎所有果樹都被危害，在臺灣中部地區一年發生兩世代。成蟲每年3-4月及8-9月出現，幼蟲則在4-5月及9-10月間發生。在枇杷則以9-10月較多，危害花蕊而影響產量。幼蟲蛀入枝條內部取食，沿木質部周圍蛀食形成環狀食痕，致使植物水份不能上升，枝葉枯萎，果實掉落。

防治方法：

經常注意有無被害枝，及時予以剪除並剪死蟲體或燒燬。目前尚無推薦藥劑，可在9-10月密度高峰期與薊馬類同時防治。

(十三)桔捲葉蚜(*Aphis citricola*)

蟲體呈黃綠色，成蟲若蟲群集新梢嫩葉吸取汁液影響發育。此蟲尚分泌蜜露，誘引螞蟻及誘發煤病(圖47)。田間以10-12月乾早期發生較多。目前尚無推薦藥劑，可與小白紋毒蛾同時防治。



圖47. 枇杷蚜蟲危害

八、採收

茂木枇杷成熟期早晚因氣候、地勢、土質及樹勢而不同，即使同一果穗上之果實成熟度亦不一致。果實在成熟前2週明顯肥大，著色前糖度急速上升，酸度降低，果頂部花萼綠色減退，肉質及內容物逐漸轉變而成熟，成熟期果皮呈黃色至橙黃色。在採收適期，果實依外觀色澤辨別成熟度再分別採收，一般應在九分熟之前採收以確保品質及貯運(圖48)。枇杷果實被覆茸毛，果肉軟而多汁，採收時應手執果梗，小心剪下果粒，輕放在有軟質襯墊物之採收籃

中，運往分級包裝場所，不可握住果實或拉扯果粒，並避免被指甲碰及或採收剪刺傷果面茸毛或引起腐爛，降低商品價值。




圖48. 枇杷果實之發育階段

臺東地區枇杷栽培管理技術

作者：盧柏松、李惠鈴

發行人：陳文雄

總編輯：江瑞拱

出版機關：行政院農業委員會臺東區農業改良場

地址：臺東市中華路一段675號

網址：<http://www.ttdares.gov.tw>

電話：089-325110

印刷廠商：法宜斯企業行

出版年月：97年6月

編印本數：1,000本

定價：新台幣140元

展售書局：國家書局臺視總店/臺北市八德路三段10號B1 (02)25781515轉643

五南書局/臺中市中山路2號 (04)22260330

GPN:1009701657

ISBN:978-986-01-4709-4